



Effet de la température seuil de développement sur la répartition géographique d'une variété

De l'adaptation de R583 dans la zone des Hauts sous le vent de La Réunion

Christophe Poser ⁽¹⁾, Laurent Barau ⁽²⁾, Marion Lecaille ⁽³⁾, Françoise Ruget ⁽⁴⁾

(1) Cirad UR SCA, Station de La Bretagne

(2) eRcane

(3) Cirad UR SCA / Université Montpellier 3


(4) INRA, EMMAH Avignon



Contexte et problématique

Limites des Hauts sous le vent

Localisation des cultures de Cannes



Contexte et problématique

Les Hauts sous le vent, une zone de contraintes



Rendements faibles, pour différentes raisons:

● **Températures plus basses**

● **Ensoleillement réduit**

● **Apports en eau irréguliers et mal répartis**

Températures minimales absolues



Contexte et problématique

Statut variétal à La Réunion (2011)


Localisation des variétés en 2011

Variété dominante

- R570
- R573
- R575
- R577
- R579
- R581
- R582
- R583
- R584
- R585

- Ligne altitudinale 200m
- Ligne altitudinale 600m
- Delimitation zones Est/Ouest
- Commune

0 2 4 8 Kilomètres






Contexte

Statut variétal à La Réunion


Localisation des variétés en 2011



Variété dominante

- R570
- R573
- R575
- R577
- R579
- R581
- R582
- R583
- R584
- R585

- Ligne altitudinale 200m
- Ligne altitudinale 600m
- Delimitation zones Est/Ouest
- Commune




Sources : BD canne 2011 DAAF, BD ortho 2008 IGN, BD variété Service Relations Clients/SIG CTIC
 Traitement : Lecaillie UR SCA, CIRAD

Contexte et problématique

De nouvelles variétés mieux adaptées


- Avant 2008: R570 et R577
- 2008: libération de la variété R583, spécifiquement adaptée à la zone des Hauts sous le vent

Résultats des variétés R570,
R577 et R583 à Vue-Belle



Contexte et problématique

Replantations sur 3 campagnes à La Réunion (2009/2010 à 2011/2012)



Contexte et problématique

Questions

- Les meilleures performances de la variété R583 dans les Hauts de l'Ouest s'expliquent-elles par une meilleure adaptation aux basses températures ?
- En particulier, cela se vérifie t'il à la levée ?
- Comment ce caractère se traduit-il sur la répartition géographique d'une variété?



Matériel et méthode

Performances de R570, R577 et R583 à la levée

Sélection et provenance des boutures

- Boutures « 1 œil » : pas de dominance apicale
- Qualité des boutures :
 - Même origine
 - Saines
 - Issues du milieu de tige





Matériel et méthode

Performances de R570, R577 et R583 à la levée

Chambres climatiques: choix des températures

- Quatre températures: 15° C, 19° C, 25° C et 28° C
- Températures constantes, encadrant la gamme de température de la zone étudiée
- Conditions d'humidité favorables





Matériel et méthode

Performances de R570, R577 et R583 à la levée

Mesures effectuées

- Temps nécessaire à la pousse de 1 cm hors du sol du bourgeon
- La date de levée de chacune des boutures est notée chaque jour et transformée en temps nécessaire à la levée (en jours)



Matériel et méthode

Utilisation d'un modèle

Choix d'un modèle mixte non linéaire sous R

$$y = (m + ma) \times (1 - e^{-((k+ka) \times (x_1 - x_2 \times Tb - (z+za)))^{(c+ca)}}) \times 100$$

Avec y = % de levée x_1 = Somme de degrés accumulés x_2 = Nombre de jours ε : terme d'erreur

Tb , m , k , z , et c les paramètres fixes du modèle

ma , ka , za et ca : les paramètres aléatoires intégrés dans le modèle lorsqu'ils sont importants (non différents de 0).

Avec $ma =$, $ka =$, $ca =$, $za =$

Matériel et méthode

Utilisation d'un modèle

Sorties du modèle

- La température seuil de fonctionnement (T_b)
- La Demie-levée (Θ_{50}), c'est-à-dire le temps nécessaire à la moitié des boutures pour lever, en somme de degré-jour au dessus de la température seuil

Matériel et méthode

Projection géographique

Le zonage réalisé

- Découpe altitudinale du territoire par tranches de 100 m d'altitude (limite haute : 1300 m)
- Découpe en transects le long des six ravines principales
- Donc 7 zones, tranchées en polygones de 100 m d'altitude, soit 91 polygones couvrant la zone d'étude auxquels sont affectées des stations météorologiques de référence



Matériel et méthode





Projection géographique

Données, corrections et calculs

- Données météorologiques (températures maximum et minimum journalières) collectées sur la plateforme Margouill@ © Cirad
- Correction des données utilisées en fonction des différences d'altitude du centroïde du polygone et de la station servant de référence selon l'équation obtenue par Chopart (2002)
- Pour chaque polygone on affecte à chaque jour du calendrier le nombre de jours nécessaires pour atteindre la demi-levée, pour les températures seuils de 11° C et de 13° C

Résultats et discussion

Levée en chambres climatiques



Résultats et discussion


Sorties du modèle*

- Les données observées ont été utilisées pour bâtir un modèle qui prédit le taux de levée en fonction du temps exprimé en jours ou en degrés jour au dessus d'une température seuil de fonctionnement calculée par le modèle

variété	Tb (se)	Θ_{50} (se)
R 570	13,03 (0,35) a	97,9 (0,3)
R 583	10,89 (0,32) b	101,7 (0,1)
R 577	11,23 (0,36) b	123.2 (0,2)


Résultats et discussion

Projection géographique





Résultats et discussion

Projection géographique



Résultats et discussion

Projection géographique






Résultats et discussion

Projection géographique

Répartition des plantations sur l'année
(3 ans)



Conclusion et perspectives

- Tests en chambres climatique utiles pour identifier des variétés mieux adaptées aux températures fraîches
- Certes, la levée n'est que la première phase d'implantation de la culture, mais une capacité à mieux lever dans des températures fraîches est un atout indéniable pour les Hauts sous le vent
- Cet avantage se maintient-il dans les autres phases de croissance de la plante?
Hypothèse réaliste compte tenu des processus voisins mis en jeu (émissions de feuilles, de talles), et des observations sur le terrain

Merci de votre attention

Remerciements particuliers:

- Techniciens et stagiaires Cirad pour les travaux en chambres climatiques, sur le terrain et saisies des données GPS
- Equipe Artist (Mickaël Mézino) pour l'aide dans la mise au point des requêtes sur données météorologiques Cirad/Météo-France
- Equipes DAAF, Ctics (Frédéric Payet) et Pôles canne pour les données d'implantations et de plantation des variétés .